

## Fava

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:38 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:16

---

### Fava (*Vicia faba*)



**Terreno:** Preferisce i terreni di medio impasto.

**Avvicendamento:** Rispettare un intervallo di tempo di 4 anni prima di ripetere la coltura sullo stesso terreno.

**Fertilizzazione:**

Elemento
----------

Quantità da Distribuire (kg/ha)
---------------------------------

N
---

## Fava

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:38 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:16

---

-

P205

150

K20

-

**Epoca e modalità di semina:** Ottobre - Novembre.

<b>Distanza tra le file</b>
<b>(cm)</b>

<b>Distanza sulla fila</b>
<b>(cm)</b>

<b>Densità d'impianto</b>
<b>(Kg./ha)</b>

## Fava

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:38 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:16

---

<b>Profondità di semina</b>
<b>(cm)</b>

## Fava

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:38 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:16

---

**Isolamento:** m. 500 da altre coltivazioni di basilico.

**Cure Colturali:** sarchiatura per il contenimento delle infestanti.

**Epoca di Taglio:** Fine Giugno e trebbiatura con macchine opportunamente adattate, a maturazione completa dei legumi.

**AVVERSITA'**

**DANNO**

**MISURE PREVENTIVE**

**MISURE DIRETTE DI LOTTA**

**Afide nero**

(  *Aphis fabae*  )

## Fava

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:38 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:16

---

Diretto: sottrazione di linfa

Indiretto: trasmissione di virus.

Nutrizione equilibrata;

La presenza di aree marginali ricche di vegetazione spontanea aumenta la popolazione di predatori

In presenza di elevata infestazione e assenza di ausiliari prima della fioritura intervenire con Piretro.

### Oidio

( *Erysiphe polygoni* )

In seguito all'attacco una efflorescenza farinosa biancastra ricopre gli organi epigei riducendone lo svil

Alla comparsa dei sintomi intervenire con Zolfo.