

Prezzemolo

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:15

PREZZEMOLO (*Petroselinum hortense*)



Fase di portaseme

Terreno: Preferisce i terreni di medio impasto argillosi

Avvicendamento: Rispettare un intervallo di tempo di 4 anni prima di ripetere la coltura sullo stesso terreno.

Fertilizzazione:

Prezzemolo

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:15

Elemento

Quantità da Distribuire (kg/ha)

N

70

P	2	O	5
---	---	---	---

150

K	2	O
---	---	---

100

Epoca e modalità di trapianto: Ottobre.

Prezzemolo

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:15

Distanza tra le file
(cm)

Distanza sulla fila
(cm)

Densità d'impianto
(piante/ha)

Profondità di trapianto
(cm)

70

25

60.000

A livello del colletto

Isolamento: 1000 m. da altre coltivazioni di prezzemolo di varietà diverse.

Prezzemolo

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:15

Cure Colturali: sarchiatura e strigliatura per il contenimento delle infestanti.

Epoca di Taglio: Metà Agosto con sfalcio a macchina in andana.

Epoca di trebbiatura: 7 – 8 giorni dopo lo sfalcio.

AVVERSITA'

DANNO

MISURE PREVENTIVE

MISURE DIRETTE DI LOTTA

Afidi

(*Disaphis apiifolia*)

Diretto: sottrazione di linfa

Prezzemolo

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:15

Indiretto: trasmissione di virusi.

Nutrizione equilibrata;

La presenza di aree marginali ricche di vegetazione spontanea aumenta la popolazione di predatori

In presenza di elevata infestazione e assenza di ausiliari prima della fioritura intervenire con: Piretro

Su colture da seme generalmente non si richiedono trattamenti specifici.

Septoriosi

(*Septoria petroselini*)

Sulla pagina superiore delle foglie si osservano macchie giallastre e poi necrotiche con conseguente n

Avvicendamento culturale;

Scegliere per la coltivazione aree ventilate ed asciutte;

Evitare le irrigazioni per aspersione.

La malattia compare sporadicamente.

Solo in presenza di periodi con piogge frequenti intervenire con : Sali di Rame.

Su colture da seme generalmente non si richiedono trattamenti specifici.

Oidio

(*Erysiphe umbrelliferarum*)

In seguito all'attacco una efflorescenza farinosa biancastra ricopre gli organi epigei riducendone lo svil

Prezzemolo

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:15

Alla comparsa dei sintomi intervenire con Zolfo.

Su colture da seme generalmente non si richiedono trattamenti specifici.