

## Soia

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:49 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:17

---

### SOIA (*Soja hispida*)



**Terreno:** Sono consigliabili terreni di medio impasto provvisti di impianto irriguo.

**Avvicendamento:** Rispettare un intervallo di tempo di 2 anni prima di ripetere la coltura sullo stesso terreno.

**Fertilizzazione:** Normalmente la concimazione azotata se abbiamo un buon attecchimento del Rizobio non occorre.

Elemento
----------

Quantità da Distribuire (kg/ha)
---------------------------------

N
---

## Soia

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:49 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:17

---

-

P	2	O	5
---	---	---	---

80

K	2	O
---	---	---

50

**Epoca e modalità di semina:** da metà Aprile - Maggio

<b>Distanza tra le file</b>
<b>(cm)</b>

<b>Distanza sulla fila</b>
<b>(cm)</b>

## Soia

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:49 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:17

---

<b>Densità d'impianto</b>
<b>(piante/mq.)</b>

<b>Profondità di semina</b>
<b>(cm)</b>

45
----

4,5 – 6,5
-----------

35 – 50
---------

2 - 3
-------

**Isolamento:** Non necessario

**Cure Colturali:** Irrigazioni necessarie specialmente nella fase di post allegazione. Di vitale importanza per la nutrizione azotata è l'inoculo liquido, una confezione di circa gr. 75 per sacco di portaseme (kg. 20-25).

**Epoca di Raccolta:** Settembre Ottobre con mietitrebbie a rotori assiali a basso regime di giri.

## Soia

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:49 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:17

---

**AVVERSITA'**

**DANNO**

**MISURE PREVENTIVE**

**MISURE DIRETTE DI LOTTA**

**Ragnetto rosso**

*(Tetranychus urticae)*

Le foglie attaccate presentano caratteristiche decolorazioni e le piante possono progressivamente disseccare.

Evitare di coltivare in vicinanza a colture che ospitano frequentemente l'acaro (fragola, fagiolo, altre leguminose).

In presenza di una elevata infestazione effettuare trattamenti ripetuti con olio paraffinico estivo.

Interessanti risultati sono stati ottenuti con olio in miscela con *Beauveria bassiana*.