

Zucchini

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:14

ZUCCHINO (*Cucurbita pepo*)



Terreno: Medio impasto tendenzialmente sciolto.

Avvicendamento: Rispettare un intervallo di tempo di 4 anni prima di ripetere la coltura sullo stesso terreno.

Colture sconsigliate in precessione: Altre cucurbitacee o solanacee.

Fertilizzazione:

Zucchini

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:14

Elemento

Quantità da Distribuire (kg/ha)

N

50

P	2	O	5
---	---	---	---

150

K	2	O
---	---	---

100

Epoca e modalità di semina: Primi di Aprile, utilizzando 6-7 kg/ha di seme.

Zucchini

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:14

Distanza tra le file
(cm)

Distanza sulla fila
(cm)

Densità d'impianto
(n° semi/ha)

Profondità di semina
(cm)

90 - 100

40 - 50

70.000 - 80.000

3 - 4

Isolamento: Distanze minime di coltivazione da rispettare:

- 500 metri fra varietà Standard appartenenti allo stesso gruppo
- 1000 metri fra Ibridi appartenenti allo stesso gruppo
- 1000 metri fra varietà Standard appartenenti a gruppi diversi

Zucchini

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:14

- 1500 metri fra Ibridi appartenenti a gruppi diversi
- 2000 metri fra varietà Standard ed Ibridi indipendentemente se dello stesso gruppo o meno

Prestare particolare attenzione alle piante coltivate negli orti.

Cure Colturali: Irrigazioni (una o due) per favorire l'emergenza e successivamente solo di soccorso; queste devono comunque essere sospese al momento del viraggio dei frutti.
Sarchiature per il controllo della flora spontanea.

Epoca di Raccolta: Primi di Settembre.

I frutti vengono distaccati manualmente e posti in andane (tempo necessario 40 ore/ha).

Epoca di Trebbiatura: Dopo circa 7 - 10 giorni dallo stacco dei frutti utilizzando apposite macchine spolpatrici fornite dalla ditta moltiplicatrice.

Lavaggio ed asciugatura seme: Deve essere realizzato nel più breve tempo possibile, generalmente presso i magazzini della ditta moltiplicatrice.

AVVERSITA'

Zucchini

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:14

DANNO

MISURE PREVENTIVE

MISURE DIRETTE DI LOTTA

Afide delle cucurbitacee

(*Aphis gossypii*)

Diretto: sottrazione di linfa

Indiretto: trasmissione di virus.

La presenza di aree marginali ricche di vegetazione spontanea aumenta la popolazione di predatori

Alla presenza delle forme alate e in assenza di ausiliari intervenire cercando di colpire la pagina inferiore

Ragnetto rosso

(*Tetranychus urticae*)

Grave soprattutto su cetriolo. Le foglie attaccate presentano caratteristiche decolorazioni e le piante sono

Zucchini

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:14

Evitare di coltivare in vicinanza a colture che ospitano frequentemente l'acaro (fragola, fagiolo, altre

Sulle giovani piantine alla presenza del ragnetto introdurre 4-8 fitoseidi/mq. In presenza di una eleva

Peronospora delle cucurbitacee

(*Pseudoperonospora cubensis*

Aree decolorate, quindi necrotiche, sulla pagina superiore delle foglie; in seguito si ha il disseccament

Avvicendamento culturale;

Scegliere per la coltivazione aree ventilate ed asciutte;

Evitare le irrigazioni per aspersione.

Su cetriolo in presenza di periodi con piogge frequenti intervenire con: Sali di rame a partire dalla 3a

Su zucchini generalmente non occorrono interventi specifici.

Oidio

(*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*

Macchie biancastre polverulente che in seguito si allargano ricoprendo tutta la foglia

Alla comparsa dei sintomi intervenire con zolfo. L'aggiunta di bagnanti (es. oli vegetali) aumenta l'eff

Zucchini

Scritto da Administrator

Mercoledì 29 Giugno 2011 11:52 - Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Giugno 2011 16:14

Maculatura angolare delle cucurbitacee

(<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	
---	---	--

Maculature fogliari prima idropiche poi brune; sui frutti aree circolari infossate di colore nocciola;
Infezione e contaminazione del seme.

Avvicendamento colturale;
Scelta di aree di coltivazione ventilate;
Eliminazione delle piante infette;
Evitare l'irrigazione per aspersione.

In presenza di sintomi intervenire con: Sali di rame
--